

GONORÉ

Gonoré overføres via ubeskyttet sex. Infeksjonen setter seg i slimhinnen som eksponeres, og smitterisikoen er høy.

Symptomer

Du kan ha fått gonoré dersom det svir når du tisser, dersom det kommer en væske fra urinrøret, skjeden eller endetarmen, eller dersom det gjør vondt i halsen.

Symptomene pleier å komme mellom et par dager og én uke etter at man er blitt smittet. Man kan også være smittet uten å ha noen symptomer i det hele tatt.

Prøvetaking

Legen tar prøve fra urinrøret og livmorhalsen, noen ganger også fra svelget og endetarmen og innsiden av øyelokket. En prøve viser om du er smittet tidligst to dager etter at du hadde sex.

Behandling

Gonoré behandles med antibiotika, som oftest i 10 dager. Behandlingsresultatet må kontrolleres av en lege én eller flere ganger.

Følgesykdommer

Hos kvinnen kan en ubehandlet gonoré forårsake egglederbetennelse, som i sin tur kan lede til kroniske magesmerter, sterilitet og svangerskap utenfor livmoren.

Hos menn kan sykdommen gi testikkelbetennelse eller betennelse i prostata. Gonoréinfeksjon kan hos både kvinner og menn forårsake øyebetennelse, leddproblemer og blodforgiftning.

